

吸入困難時の代替薬(DPI→pMDI/SMI)

稲沢厚生病院 内科

2024年7月作成

●適応:気管支喘息 ICS/LABA

製品名(DPI)	用法用量		製品名(pMDI/SMI)	用法用量
シムビコートタービューヘイラー	1日2回 1回1~2吸入	➡	フルティフォーム125エアゾール	1日2回 1回2吸入
レルベア100エリプタ	1日1回 1回1吸入			
シムビコートタービューヘイラー	1日2回 1回3吸入	➡	フルティフォーム125エアゾール	1日2回 1回3吸入
レルベア200エリプタ	1日1回 1回1吸入			
シムビコートタービューヘイラー	1日2回 1回4吸入	➡	フルティフォーム125エアゾール	1日2回 1回4吸入

●適応:COPD LAMA/LABA

製品名(DPI)	用法用量		製品名(pMDI/SMI)	用法用量
アノーロエリプタ	1日1回 1回1吸入	➡	スピオルトレスピマツ	1日1回 1回2吸入

●適応:COPD ICS/LAMA/LABA

製品名(DPI)	用法用量		製品名(pMDI/SMI)	用法用量
テリルジー100エリプタ	1日1回 1回1吸入	➡	ビレーズトリエアロスフィア	1日2回 1回2吸入
テリルジー200エリプタ	1日1回 1回2吸入			

DPI:ドライパウダー吸入器

pMDI:加圧噴霧式吸入器

SMI:ソフトミスト吸入器

ICS:吸入ステロイド薬

LABA:長時間作用型β2受容体作動薬

LABA:長時間作用型抗コリン薬